

Heilpraktikerprüfung Psychotherapie Oktober 2022

1. Mehrfachauswahl

Bei welchen der folgenden Erkrankungen ist die Letalität (Sterberisiko) am höchsten?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Schizophrenie
- B Anorexia nervosa
- C Hypochondrische Störung
- D Somatoforme autonome Funktionsstörung (Herz- und Kreislaufsystem)
- E Generalisierte Angststörung

2. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur geistigen Behinderung treffen zu?

1. Menschen mit geistiger Behinderung haben oft eine Mehrfachbehinderung
 2. Von einer mittelgradigen Intelligenzminderung (Imbezillität) spricht man bei einem Intelligenzquotienten (IQ) von 85
 3. Bei Kindern mit geistiger Behinderung gelingt es heute in über 90 % der Fälle die Ursache zu klären
 4. Bei Kindern mit geistiger Behinderung besteht ein erhöhtes Risiko an einer psychischen Störung zu erkranken
 5. Zu den präventiven Maßnahmen gegen bestimmte angeborene Intelligenzminderungen gehören Schutzimpfungen der Mutter vor Eintritt der Schwangerschaft
- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
 - B Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
 - C Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
 - D Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
 - E Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

3. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur primären Enuresis treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten

- A Über ein Jahr nach bereits erworbener Blasenkontrolle tritt wieder Einnässen auf
- B Familiäre Häufig wird nur selten beobachtet
- C Primäre Enuresis bezeichnet Einnässen bei einem Kind, das noch nie längere Zeit trocken war
- D Der Verlauf zeigt eine hohe Spontanheilungsrate
- E Am häufigsten tritt sie tagsüber auf (Enuresis diurna)

4. Einfachauswahl

Welche Aussage zu den diagnostischen Kriterien der schizoiden Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) trifft zu?

- A Eigene Bedürfnisse werden den Bedürfnissen anderer Personen untergeordnet
- B Es besteht eine emotionale Kühle, Distanziertheit oder flache Affektivität
- C Es besteht eine niedrige Frustrationstoleranz
- D Es zeigt sich ein übertriebener Ausdruck von Gefühlen
- E Soziale Konventionen werden übermäßig stark befolgt

5. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
In der dialektisch-behavioralen Therapie (DBT) zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen vom Borderline-Typ

1. ist die Vermittlung von Skills (Fertigkeiten) ein Kernstück der DBT
2. kann das Skillstraining je nach Symptomatik der Patienten unterschiedlich komponiert werden
3. soll die Emotionsregulation verbessert werden
4. werden Problemlösungsfertigkeiten und soziale Kompetenzen trainiert
5. findet der Einsatz von kognitiven Methoden keine Anwendung

- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

6. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Zu den Ich-Störungen gehören:

1. Derealisation
2. Gedankenabreißen
3. Gedankenausbreitung
4. Gedankendrängen
5. Gedankeneingebung

- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- E Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

7. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Depression treffen am ehesten zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Inhaltliche Denkstörungen treten bei depressiven Episoden nicht auf
- B Bei einer akuten schweren depressiven Episode führt eine Krankschreibung in der Regel zu einer deutlichen Verbesserung der Antriebshemmung
- C Der Unterschied zwischen depressiver Episode und Dysthymie liegt im Wesentlichen im Schweregrad und im zeitlichen Verlauf der Beschwerden
- D Ohne Behandlung folgt auf eine depressive Episode meist eine Manie
- E Medikamente können Depressionen auslösen

8. Einfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Abhängigkeitserkrankungen bzw. abhängigen Verhaltensweisen trifft zu?

- A Abhängigkeiten sind nur für Substanzen möglich
- B Hauptkriterium der Diagnose einer Alkoholabhängigkeit (nach ICD-10) ist eine Trinkmenge an reinem Alkohol von mindestens 24 Gramm täglich (Männer) bzw. 12 Gramm täglich (Frauen)
- C Polytoxikomanie bezeichnet den Missbrauch einer Substanz über viele Monate
- D Kontrollverlust im Rahmen der Diagnose einer Abhängigkeitserkrankungen bedeutet, über sein Leben die Kontrolle zu verlieren
- E Die Diagnose eines schädlichen Gebrauchs (nach ICD-10) erfordert eine Schädigung der psychischen oder physischen Gesundheit des Betroffenen

9. Einfachauswahl

In der Verhaltenstherapie wird die Technik der Löschung (Extinktion) eingesetzt. Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- A Verhaltenslöschung gelingt am schnellsten und am dauerhaftesten, wenn die vorherige Verstärkung des Verhaltens unregelmäßig und selten erfolgte
- B Verstärker, die ein Verhalten aufrechterhalten, werden bei der Löschung identifiziert und dann entfernt
- C Verhalten, das unter sehr gleichmäßigen Bedingungen kontinuierlich verstärkt und aufrechterhalten wurde, kann nicht gelöscht werden
- D Löschung ist dann indiziert, wenn die Häufung eines Verhalten gesteigert werden soll
- E Die Technik der Löschung führt in der Regel zu einem sehr schnellen Abbau des Verhaltens

10. Mehrfachauswahl

Bei einem wegen einer schizophrenen Psychose unter rechtlicher Betreuung stehenden Patienten soll eine geplante Herzkatheteruntersuchung mit eventuell erforderlicher Bypass-Operation durchgeführt werden. Der Betroffene lehnt diese Untersuchung ab. Die Betreuung umfasst den Aufgabenbereich Gesundheitspflege. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Der Betreuer befürwortet die Untersuchung und gibt dem Arzt die Einwilligung zur Untersuchung
- B Ist der Betroffene zum Zeitpunkt der anstehenden Untersuchung einwilligungsfähig, darf die Untersuchung nicht stattfinden
- C Ist der Betroffene zum Zeitpunkt der anstehenden Untersuchung nicht einwilligungsfähig, lehnt der Betreuer auf dessen Wunsch hin ebenfalls die Herzkatheteruntersuchung ab
- D Ist der Betroffene zum Zeitpunkt der anstehenden Untersuchung nicht einwilligungsfähig, darf der Betreuer die Untersuchung anordnen
- E Ist der Betroffene zum Zeitpunkt der anstehenden Untersuchung nicht einwilligungsfähig, beantragt der Betreuer die Genehmigung beim Betreuungsgericht

11. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Abwehrmechanismen im Sinne der Psychoanalyse sind:

1. Projektion
 2. Regression
 3. Amnesie
 4. Identifikation
 5. Perseveration
- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - B Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
 - C Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
 - D Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
 - E Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

12. Mehrfachauswahl

Eine 65-jährige Patientin befindet sich wegen somatoformer Funktionsstörung des unteren Verdauungssystems (Colon irritabile) in psychotherapeutischer Behandlung.
Welche der folgenden Beschwerden sind im Rahmen der Differentialdiagnose am ehesten ein Hinweis auf ein Dickdarmkarzinom?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Völlegefühl
- B Hörbare Darmgeräusche
- C Blähungen
- D Blutbeimischung zum Stuhl
- E Gewichtsverlust

13. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa (nach ICD-10) treffen am ehesten zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Es ist mit der Diagnose Bulimia nervosa vereinbar, wenn jemand seinen Essanfall nicht überraschend bekommt, sondern plant und gezielt Nahrungsmittel für den Essanfall einkauft
- B Charakteristisch ist das wiederholte Hochwürgen der Nahrung mit nochmaligem Kauen und Schlucken
- C Bei Jugendlichen mit Bulimia nervosa treten keine Elektrolytstörungen auf
- D Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist die Therapie der ersten Wahl
- E Gegen die bulimische Störung spricht ein normales Körpergewicht

14. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa (nach ICD-10) treffen am ehesten zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Es ist mit der Diagnose Bulimia nervosa vereinbar, wenn jemand seinen Essanfall nicht überraschend bekommt, sondern plant und gezielt Nahrungsmittel für den Essanfall einkauft
- B Charakteristisch ist das wiederholte Hochwürgen der Nahrung mit nochmaligem Kauen und Schlucken
- C Bei Jugendlichen mit Bulimia nervosa treten keine Elektrolytstörungen auf
- D Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist die Therapie der ersten Wahl
- E Gegen die bulimische Störung spricht ein normales Körpergewicht

15. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Faktoren, die bei der Erstmanifestation einer Schizophrenie hinsichtlich der Prognose als eher günstig gelten, sind:

- A Cannabiskonsum
- B Weibliches Geschlecht
- C Akuter Krankheitsbeginn
- D Schleichender Krankheitsbeginn
- E Auftreten von Schizophrenie bei nahen Angehörigen

16. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Asperger-Syndrom (nach ICD-10) treffen zu?

1. Es ist vor allem durch Schwächen in den Bereichen der sozialen Interaktion und Kommunikation gekennzeichnet
 2. Die Intelligenz ist in den meisten Fällen normal ausgeprägt
 3. Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen
 4. Die ersten Auffälligkeiten treten bereits in den ersten Lebensmonaten zu Tage
 5. Die betroffenen Kinder fallen durch extreme Sprachentwicklungsstörung auf
- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 - B Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
 - C Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
 - D Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 - E Alle Aussagen sind richtig

17. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung (nach ICD-10) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A Es treten häufig Zwangssymptome auf
- B Die Symptome halten meist nicht länger als 6 Monate an
- C Bei Jugendlichen kann aggressives oder dissoziales Verhalten auftreten
- D Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Wahnsymptomatik auftreten
- E Es besteht immer eine psychosoziale Belastung von katastrophalem Ausmaß

18. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum pathologischen Spielen (nach ICD-10) treffen am ehesten zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Jede Art des Glücksspiels hat das gleiche Gefährdungspotenzial für eine Abhängigkeitsentwicklung
- B Als Begleiterkrankung tritt häufig Substanzmissbrauch auf
- C Pathologisches Spielen ist definiert als exzessives Spielen manischer Patienten
- D Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist bisher noch unzureichend belegt
- E Wichtig für die Diagnosestellung ist das Vorliegen eines Kontrollverlusts über das Spielverhalten

19. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Symptome der Katatonie sind:

1. Spastik der Extremitäten
 2. Sprachstereotypien
 3. Mutismus
 4. Psychomotorische Erregung
 5. Negativismus
- A Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
 B Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
 C Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
 D Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
 E Alle Aussagen sind richtig

20. Einfachauswahl

Welche Aussage zum Suizid trifft zu?

- A Bei Jugendlichen ist Suizid eine sehr seltene Todesursache
 B Bei Menschen, die an Suizid verstorben sind, bestand meist eine psychische Erkrankung
 C Bei Personen, die bereits mehrere Suizidversuche hinter sich haben, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich suizidieren
 D Nach Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik haben Patienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein geringeres Suizidrisiko
 E Die Suizidrate in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen

21. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Ein Behandlungs- bzw. Tätigkeitsverbot besteht für Inhaber einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Heilpraktikererlaubnis für die

1. Verhaltenstherapie bei einem zwangskranken Patienten mit Neurosyphilis
 2. Verordnung von Betäubungsmitteln bei einem Patienten mit hyperkinetischer Störung
 3. psychotherapeutische Behandlung der depressiven Störung eines Patienten mit chronischer Virushepatitis C
 4. Empfehlung einer beschützenden stationären Behandlung bei einem Patienten mit paranoider Schizophrenie
 5. Psychoedukation bei einem alkoholkranken Patienten mit Leberzirrhose
- A Nur die Aussage 2 ist richtig
 B Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
 C Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
 D Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
 E Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig

22. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Agoraphobie (nach ICD-10) treffen zu?

1. Die Symptome sind primäre Manifestationen der Angst und beruhen nicht auf andere Symptome wie Wahn oder Zwangsgedanken
2. Die Angst tritt auf öffentlichen Plätzen, in Menschenmengen, beim allein Reisen oder Reisen mit weiter Entfernung von Zuhause auf
3. Die Angst flottiert frei
4. Vermeidung ist ein entscheidendes Symptom
5. Eine Behandlung mit Expositionsverfahren ist grundsätzlich kontraindiziert

- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

23. Mehrfachauswahl

Ein Therapeut überlegt, ob bei einem Patienten die Technik der kognitiven Umstrukturierung indiziert ist.

Wann sollte er am ehesten von der Anwendung dieser Technik absehen?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Dem Patienten ist es trotz therapeutischer Unterstützung unmöglich, Gedanken zu benennen
- B Es ist motivierende Gesprächsführung erforderlich, damit sich der Patient zum kognitiven Arbeiten bereit erklärt
- C Bei dem Patient besteht ein Mindestmaß an Einsicht in kognitive Prozesse
- D Der Patient leidet an Zwangsgedanken, die er selbst als sinnlos erlebt
- E Der Patient kommt nach einem abgeklungenen psychotischen Zustand zur Behandlung

24. Aussagenkombination

Welcher der folgenden Aussagen zur Demenz bei Alzheimer-Krankheit trifft (treffen) zu?

1. Die Erkrankung entwickelt sich als unmittelbare Folge von Gefäßveränderungen im Gehirn
2. Die Demenz bei Alzheimer-Krankheit ist nach der alkoholbedingten Demenz die zweithäufigste Demenzerkrankung
3. Die Erkrankung entwickelt sich meist schleichend mit sich kontinuierlich verschlechternder Symptomatik
4. Wahnideen und Halluzinationen treten nicht auf
5. Bei einem prämorbid hohen intellektuellen Leistungsniveau treten nur leichtere Demenzsymptome auf

- A Nur die Aussage 3 ist richtig
- B Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- C Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- E Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

25. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zu den inhaltlichen Denkstörungen gehören:

- A Überwertige Ideen
- B Konkretismus
- C Paralogik
- D Kontamination
- E Symbiotischer Wahn (Folie à deux)

26. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zu den Affektiven Störungen (nach ICD-10) zählen:

- A Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (AHDS)
- B Entzugssyndrom mit Delir
- C Hypomanie
- D Somatisierungsstörung
- E Zyklothymia

27. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen für eine Lese- und Rechtschreibstörung (nach ICD-10) zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Eine umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache geht der Lese- und Rechtschreibstörung häufig voraus
- B Die Störung tritt vor allem im Rahmen einer allgemeinen Intelligenzminderung auf
- C Ein Defizit des Leseverständnisses ist typischerweise nicht vorhanden
- D Die Leseleistung muss unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und Beschulung zu erwarten wäre
- E Soziale und emotionale Anpassungsprobleme stehen mit einer Lese- und Rechtschreibstörung in keinem Zusammenhang

28. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Kognitive Verhaltenstherapie mit einem Konfrontationsverfahren ist in der Regel vorrangige Behandlungsmethode bei einer/einem

- A Alkoholdelir
- B spezifisch (isolierten) Phobie
- C Rett-Syndrom
- D Manie
- E katatonen Schizophrenie